

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。このために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

商品名：ベガモックス点眼液 0.5%

主成分：塩酸モキシフロキサシン（Moxifloxacin Hydrochloride）

剤形：点眼剤（プラスチック点眼容器）

点眼液の色：淡黄色～緑黄色澄明

キャップの色：ワインレッド

シート記載：



この薬の作用と効果について

- ・結膜炎や麦粒腫（ものもらい）など目の感染症を起こしている細菌が増えるのを防ぐ効果があります。
- ・通常、結膜炎や麦粒腫（ものもらい）などの目の感染症の治療や、目の手術前後の感染予防に用います。

次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- ・以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。目薬を使って、目のまわりがはれたり、かゆくなったりしたことがある。
- ・妊娠または授乳中。
- ・他に薬を使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、大衆薬も含めて他に使用中の薬に注意してください）。
- ・コンタクトレンズを使っている。

用法・用量（この薬の使い方）

- ・あなたの用法・用量は 医療担当者記入

- ・結膜炎や麦粒腫（ものもらい）などの目の感染症の場合

通常、1回1滴、1日3回点眼しますが、症状により適宜回数を増減されます。必ず指示された使用方法に従ってください。

- ・目の手術前後の場合

通常、手術前は1回1滴、1日5回、手術後は1回1滴、1日3回点眼します。必ず指示された使用方法に従ってください。

- ・点眼前はよく手指を洗います。点眼するときは容器の先端が目や目のまわり（まぶた、まつげ）に触れないように注意してください。点眼後しばらくはまばたきをしないで、目を閉じていてください。あふれた液は清潔なティッシュなどでふき取ってください。他の目薬を使う場合は5分以上間隔をあけてください。
- ・点眼し忘れた場合は、気がついた時、すぐに1回分を点眼してください。ただし次に点眼する時間が近い場合には点眼せず、次の通常の時間に1回分を点眼してください。2回分を一度に点眼しないでください。
- ・誤って多く点眼した場合は、医師または薬剤師に相談してください。
- ・医師の指示なしに、自分の判断で使うのを止めないでください。

生活上の注意

この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、目がしみる、苦味を感じる、目が赤くなる、目の痛み、目がゴロゴロする、まぶたが赤くなる、目がかすむ、まぶしい、涙が出るなどが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

息苦しい、全身の皮膚が赤くなる、めまい[ショック、アナフィラキシー様症状]

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

保管方法その他

- ・乳幼児や小児の手の届かないところで、直射日光を避けて保管してください。
- ・室温（1～30℃）で保管してください。
- ・薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。

医療担当者記入欄

年 月 日